

Complicaciones materno-perinatales en gestantes con edad avanzada atendidas en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, Misiones durante el año 2019

M. ZORZANO¹; J. CAFFETTI¹⁻²; M. KOSTECKI¹⁻³

1 Universidad Católica de las Misiones, Facultad de Ciencias de la Salud, Misiones, Argentina.

2 Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de Misiones (UNaM-IBS-CONICET), Misiones, Argentina.

3 Hospital Materno Neonatal de la provincia de Misiones, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El embarazo antes de los 20 y después de los 35 años, se asocia a un mayor riesgo materno y perinatal.

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia definió como "añosa" (madre tardía) a toda mujer que se embaraza después de los 35 años.

El embarazo y el parto son procesos fisiológicos, pero existen situaciones y condiciones que hacen que las gestantes y sus neonatos presenten riesgos de morbi-mortalidad. Una de estas condiciones son los embarazos en madres tardías.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la frecuencia de las complicaciones maternas-perinatales de las mujeres de edad mayor o igual de 35 años que tuvieron su evento obstétrico en el Hospital Materno Neonatal de Posadas-Misiones en el año 2019.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. Los datos fueron obtenidos de la Historia Clínica Perinatal, donde se tomaron variables maternas y fetales de mujeres cuya edad fuera mayor o igual a 35 años, que hayan cursado su evento obstétrico en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, Misiones durante el año 2019. Excluyendo del estudio aquellas mujeres con historia clínica incompleta.

Esta investigación respeta las normas en materia de bioética contenidas en la declaración de Helsinki.


RESULTADOS

Se incluyeron 554 mujeres y 552 neonatos, siendo la prevalencia de madres tardías del 13,35% durante el año 2019.

Se produjeron 11 embarazos gemelares (1,99%), 12 abortos (2,17%) y 20 fetos muertos (3,61%). Al nacer, obitaron 9 (1,7%) recién nacidos.

La complicación materna más frecuente fue la anemia (32,3%) seguida de la preeclampsia (20,8%).

La complicación neonatal más frecuente fue la prematuridad (14,7%) y el 16,1% de los recién nacidos necesitaron estimulación al momento del nacimiento. Se registraron 11 casos de malformaciones congénitas, siendo el síndrome de Down y la comunicación interventricular más frecuentes.




COMPLICACIONES MATERNAS

	CON COMPLICACIONES		SIN COMPLICACIONES		Chi2	p-valor	
	n	%	n	%			
Estado civil	Casada	99	88,4	13	11,6	7,89	0,04
	Unión estable	323	92,8	25	7,2		
	Soltera	83	98,8	1	1,2		
	Otro	9	90	1	10		
Total	514	100	40	100			

Complicaciones maternas



Complicaciones Neonatales



CONCLUSIONES

En Misiones la edad materna avanzada es una problemática frecuente, tanto para la madre como el neonato. Los resultados obtenidos permiten dar a conocer las complicaciones maternas y perinatales que pueden encontrarse en madres tardías en la región y contribuir a la concientización del embarazo en edad avanzada previniendo los riesgos asociados.

REFERENCIAS

- Donoso E, Carvajal JA, Vera C, Poblete JA. La edad de la mujer como factor de riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil. Rev. méd. Chile [Internet]. 2014 [20/10/2019]; 142 (2): 168-174. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v142n2/art04.pdf>
- Aguilar Cueva SR. Parto pretérmino en gestantes con edad materna avanzada, Hospital Nacional Hipólito Unanue. Lima, Perú. Rev Int Salud Materno Fetal [Internet]. 2017 [19/11/2020]; 2 (4): 3-7. Disponible en: <http://ojs.revistamaternofetal.com/index.php/RISMF/article/view/33/33>

AGRADECIMIENTOS

A mis directoras, por su apoyo continuo; a la Universidad Católica de las misiones y al Hospital Materno Neonatal por abrirme sus puertas y formarme como profesional.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Email: milagros55@live.com.ar